

## 緊急異常値

検査データに異常値を検出した場合は、測定後速やかにFAX・お電話でご報告致します

2015年1月現在

	検査項目名	緊急報告基準値	備考
血液学	白血球数(WBC)	1,500 以下、20,000 以上 (/ $\mu$ L)	
	ヘモグロビン(Hb)	5.0 以下、20.0 以上 (g/dL)	透析患者検体は除外致します
	血小板数(PLT)	3万 以下、100万 以上 (/ $\mu$ L)	透析患者検体は除外致します
	白血球像	プラスト出現 異型細胞多数出現 EBL(赤芽球)多数出現 (30/200以上)	初診者より検出した場合のみと致します。
	プロトロンビン時間-INR	30 以上(秒) 2.00 以上	
	活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)	60秒 以上	
生化学	血中アンモニア(NH <sub>3</sub> )	400 以上 ( $\mu$ g/dL)	徐蛋白不良が考えられる場合はコメントにて連絡致します
	グルコース(空腹時)	50 以下、500 以上 (mg/dL)	低値はNaF入りGlu用採血管使用のもののみと致します
	AST(GOT)	500 以上 (U/L)	
	ALT(GPT)	500 以上 (U/L)	
	LD(LDH)	1,000 以上 (U/L)	
	血清アミラーゼ(S-AMY)	1,000 以上 (U/L)	
	総ビリルビン(T-BIL)	12.0 以上 (mg/dL)	新生児は除外致します
	ナトリウム(Na)	120 以下、160 以上 (mEq/L)	
	カリウム(K)	2.5 以下、7.0 以上 (mEq/L)	
	カルシウム(Ca)	6.0 以下、12.0 以上 (mg/dL)	
	尿素窒素(UN)	80.0 以上 (mg/dL)	透析患者検体は除外致します
	総蛋白(TP)	3.5 以下、10.0 以上 (g/dL)	
	尿酸(UA)	2.0 以下、12.0 以上 (mg/dL)	透析患者検体は除外致します
	クレアチニン(CRE)	8.00 以上 (mg/dL)	透析患者検体は除外致します
	CK(CPK)	1,000 以上 (U/L)	
ALP(アルカリフォスファターゼ)	1,500 以上 (U/L)		
浸透圧 血清	255 以下、330 以上 (mOsm/L)		
血清	CRP 定量	30.00 以上 (mg/dL)	
	ABO式血液型	表裏試験結果不一致	
	直接クームス	(+)	新生児に限ります
細菌	血液 培養	菌の検出	下記参照
	髄液 塗末・培養	菌の検出	
	培養	一類、二類、三類感染症原因菌の検出	
		バンコマイシン耐性腸球菌 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌の検出	
一般	尿糖定性	(+)	新生児に限ります
	尿中ケトン体	(+)	新生児に限ります
	尿沈査	ろう様円柱(+)	

	検査項目名	緊急報告基準値	備考
薬物検査	フェニバルピタール	60 以上 ( $\mu$ g/mL)	
	プリミドン	15 以上 ( $\mu$ g/mL)	
	フェニトイン	30 以上 ( $\mu$ g/mL)	
	カルバマゼピン	12 以上 ( $\mu$ g/mL)	
	バルプロ酸ナトリウム	150 以上 ( $\mu$ g/mL)	
	エトスクシミド	120 以上 ( $\mu$ g/mL)	
	炭酸リチウム	2.00 以上 (mEq/L)	
	ジゴキシン	2.5 以上 ( $\mu$ g/mL)	
	テオフィリン	25 以上 ( $\mu$ g/mL)	
	プロカインアミド	16 以上 ( $\mu$ g/mL)	
	リドカイン	5.1 以上 ( $\mu$ g/mL)	
	ゲンタマイシン	12 以上 ( $\mu$ g/mL)	
	トブラマイシン	12 以上 ( $\mu$ g/mL)	
	アミカシン	35 以上 ( $\mu$ g/mL)	
	バンコマイシン	60 以上 ( $\mu$ g/mL)	
サリチル酸	400 以上 ( $\mu$ g/mL)		

：ボトルに陽性反応が認められた時点で培養液の塗末検査を実施しFAXにて中間報告致します。  
 同定菌名が確定した時点および感受性の結果が確定した時点につきましても、上記に加え  
 中間報告致します。